

TEL: +30 31 796 264, FAX: +30 31 796 343
E mail: varinst@spark.net.gr, Internet: <http://www.varinst.gr>

Σ Ι Τ Η Ρ Α – Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο
(ΒΡΩΜΗ, ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΡΥΖΙ, ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ)
C E R E A L S - G E N E R A L F O R M
(OAT, DURUM WHEAT, SOFT WHEAT, BARLEY, RICE, TRITICALE)

Ομάδα Α (Group A)
Ομάδα Β (Group B) (1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική ονομασία Final denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Είδος / Species _____

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή της ποικιλίας (ονόματα γονέων) /
Variety origin and methods of development used (name of Components) _____

Τρόποι πειραματισμού / Methods of experimentation (2)

- Τύπος πειραματισμού / Type of experimentation
- Ζώνες πειραματισμού / Zones of experimentation

Σημείωση: (1) **Ομάδα Α:** Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα.

Note : **Group A:** Varieties the seeds of which are going to be marketed in Greece.

Ομάδα Β: Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν στην Ελλάδα με σκοπό να γίνει εξαγωγή σε άλλες χώρες.

Group B: Varieties with seed-production in Greece in order to be exported to other countries.

Σημείωση: (2) **Τρόποι πειραματισμού / Methods of experimentation**

Note:

Πειραματικός τύπος I : Η παραγωγικότητα της ποικιλίας που εκφράζεται με την απόδοση εκτιμάται με τη βοήθεια πειραματικών που γίνονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όπου όλες οι ποικιλίες (και οι μάρτυρες) δέχονται τις ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες.

Experimental type I : The productivity of the Variety expressed as yield per stremma, is estimated in field experiments, that are conducted under the most favorable conditions. The treatments applied in these trials are the same for all the Varieties included.

Πειραματικός τύπος II : Η παραγωγικότητα της ποικιλίας εκτιμάται με τη βοήθεια συμπληρωματικών δοκιμών που γίνονται με τεχνική καλλιέργειας που είναι κατάλληλη τόσο για τις υπόψη ποικιλίες όσο και για τους μάρτυρες. Ο τύπος αυτός πειραματισμού γίνεται μόνο αν ζητηθεί στην αίτηση.

Experimental type II : If a special experimentation is needed, in order to check a specific character of a new Variety, it takes place upon request. In these trials the yield of the Variety is assessed.

Ζώνη I : Ψυχρές περιοχές : Δυτική Μακεδονία, Θράκη και ορεινές περιοχές όλης της χώρας (στο Θεωρητικό Μάρτυρα συμπεριλαμβάνεται μια ποικιλία ανθεκτική στο κρύο).

Zone I : Cold areas : Macedonia west, Thraki and highland areas of the whole Country. The theoretical control-variety (or theoretical check-variety) includes and a cold resistant Variety as well.

Ζώνη II : Θερμές περιοχές : Όλη η υπόλοιπη χώρα.

Zone II : Warm areas : All rest Country.

ΒΡΩΜΗ / OATΣπορά το φθινόπωρο / Autumn sow
Ζώνη I / Zone I

Ζώνη II / Zone II

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ / EXPERIMENTATION

τύπος I / type I

τύπος II / type II

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ / DURUM WHEATΣπορά το φθινόπωρο / Autumn sow
Ζώνη I / Zone I

Ζώνη II / Zone II

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ / SOFT WHEATΣπορά το φθινόπωρο / Autumn sow
Ζώνη I / Zone I

Ζώνη II / Zone II

ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ / WINTER BARLEYΣπορά το φθινόπωρο / Autumn sow
Ζώνη I / Zone I

Ζώνη II / Zone II

ΚΡΙΘΑΡΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ / SPRING BARLEYΣπορά μέχρι τέλους χειμώνα, αρχές άνοιξης /
Sowing period: Winter ending – early in Spring

Ζώνη I / Zone I

Ζώνη II / Zone II

ΡΥΖΙ / RICE

Σπορά αξιζιάτικη / Spring sow

Ζώνη πειραματισμού: Καλοχώρι / Experimentation zone: Kalohori

ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ / TRITICALE

Σπορά το φθινόπωρο / Autumn sow

Ζώνη I / Zone I

Ζώνη II / Zone II

Να σημειωθεί με ένα σταυρό (+) το ή τα τετραγωνάκια που αντιστοιχούν σε ζώνη και τύπο πειραματισμού. /

Check with a cross (+) the corresponding to the experimentation zones square in the proper column of experimentation type.

