

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

4.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Μ. Ροδιτάκη, Ρ. Οικονομάκη, Σ. Λούρου.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ:

Πρώιμες και παραλιακές περιοχές: Κρόκισμα των ανθιδίων στις ταξιανθίες, έναρξη της άνθισης (στάδια E και F). Παρατηρείται ανομοιόμορφη ανθοφορία, διαταραγμένη κατά τόπους.

Μεσοπρώιμες περιοχές: Συνεχίζεται το φούσκωμα των ανθιδίων στις ταξιανθίες (στάδιο D).

Όψιμες περιοχές: Ολοκληρώνεται ο σχηματισμός των ταξιανθιών (στάδιο C).

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέϊκη)



Στάδιο C: Σχηματισμός των ταξιανθιών.



Στάδιο D: Φούσκωμα των ανθιδίων στις ταξιανθίες.



Στάδιο E: Κρόκισμα



Στάδιο F: Έναρξη άνθισης



Πυρηνοτρήτης: Προσβολή σε κλειστό άνθος.



Βαμβακάδα: Λευκά κηρώδη εκκρίματα καλύπτουν τις ταξιανθίες.

Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ

<p>ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: (<i>Prays oleae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Σύσταση:</p> <p>Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:</p>	<p>Στις <u>πρώιμες</u> περιοχές η <u>ανθόβια γενιά</u> του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί.</p> <p>– <u>Ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν χρειάζονται καταπολέμηση στη γενιά αυτή.</u></p> <p>– Οι προνύμφες που περιφέρονται στα άνθη μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές προσβολές σε <u>ελαιώνες με μέτρια ή μειωμένη ανθοφορία (<50% της κανονικής).</u></p> <p>– Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης της ανθόβιας γενιάς είναι στην <u>έναρξη της άνθισης</u> (από το κρόκισμα έως 25% ανοικτών ανθέων).</p> <p>– <u>Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας</u> η αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη πρέπει να γίνει σε αυτή τη γενιά διότι έχουν περιορισμένα μέσα για την επόμενη (καρπώβια γενιά). Συστήνεται επανάληψη της επέμβασης ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό προσβολής.</p> <p>Για <u>μεσοπρώιμες</u> και <u>όψιμες</u> περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p> <p>Κατά τη διάρκεια της άνθισης προτείνεται η χρήση μικροβιακών σκευασμάτων του βακίλου της Θουριγγίας ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος που να μην δεν διαταράσσει τα έντομα επικονίασης και τα ωφέλιμα παράσιτα και αρπακτικά.</p> <p><u>Περίοδος άνθοφορίας: <i>Bacillus thuringiensis</i>, <i>Beta cyfluthrin</i> (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), <i>Lambda cyhalothrin</i> (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), <i>Thiacloprid</i> (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 14 ημ.), <i>Phosmet</i> (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ.), <i>Chlorpyrifos methyl</i> (2 εφαρμογές, αναμονή 60).</u></p>
<p>Β Α Μ Β Α Κ Α Δ Α : (<i>ΨΥΛΛΑ</i>) (<i>Euphyllura phillyrae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:</p>	<p>Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύπτοντας με χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριμα (βαμβακάδα) και μελιτώματα τις ταξιανθίες και τις κορυφές των νέων βλαστών. <u>Συνήθως δεν ζημιώνει την παραγωγή.</u></p> <p>Ανάγκη αντιμετώπισης έχουν <u>ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία και προσβολή σε ποσοστό ανθέων μεγαλύτερο από 30%.</u></p> <p>Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα με προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πυρηνοτρήτη.</p> <p><u>Παραφινικά λάδια (1-2 εφαρμογές/14 ημ.), Άλατα λιπαρών οξέων (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημέρες), <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες).</u></p>
<p>Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : (<i>Palpita unionalis</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:</p>	<p>Οι προνύμφες της ανοιξιάτικης γενιάς προσβάλουν την νεαρή ακραία βλάστηση.</p> <p>– Στις <u>πρώιμες περιοχές</u> συστήνεται άμεσα προστασία των <u>νεαρών δέντρων</u> σε νέες φυτείες και φυτώρια και των <u>δέντρων που έχουν υποστεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.</u></p> <p><u>Περίοδος άνθοφορίας: <i>Deltamethrin</i> (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), <i>Phosmet</i> (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ).</u></p>

▪ Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων και φροντίστε να τηρούνται αυστηρά για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Μην ψεκάσετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, πχ. με άνεμο.

Ηράκλειο 5 Απριλίου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει να συνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά).